

## **Cahier des charges de la dénomination « Pintade de l'Ardèche »**

associé à l'[arrêté du 18 novembre 2014](#) relatif à l'homologation du cahier des charges concernant la dénomination « Pintade de l'Ardèche » en vue de la transmission à la Commission européenne d'une demande d'enregistrement en tant qu'indication géographique protégée

**Bulletin officiel du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt n° 49-2014**

### **SERVICE COMPÉTENT DE L'ÉTAT MEMBRE**

Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)  
Arboreal – 12, rue Rol-Tanguy  
TSA 30003 – 93555 Montreuil-sous-Bois Cedex  
Tél. : (33) (0)1 73 30 38 00  
Fax : (33) (0)1 73 30 38 04  
Courriel : [info@inao.gouv.fr](mailto:info@inao.gouv.fr)

### **GROUPEMENT DEMANDEUR**

Groupement de Qualité des Volailles Fermières de l'Ardèche.  
Siège Social et Administratif :  
Z.A. Le Flacher  
07340 FELINES  
Tél. : 04-75-34-59-06  
Fax : 04-75-34-88-05  
Courriel : [patrice.pierre@ldc.fr](mailto:patrice.pierre@ldc.fr)

### **TYPE DE PRODUIT**

Classe 1.1 : « Viande (et abats) frais ».

### **1) NOM DU PRODUIT**

« Pintade de l'Ardèche »

### **2) DESCRIPTION DU PRODUIT**

La « Pintade de l'Ardèche » est un oiseau de l'ordre des galliformes :

- élevé en plein air avec un accès libre à un parcours arboré naturellement recouvert de gravillons ;
- nourri avec une alimentation composée à 100% de végétaux, minéraux et vitamines, dont 80% minimum de céréales et produits dérivés de céréales en phase d'engraissement.

Elle présente un plumage gris, ses pattes sont également grises.

L'utilisation de souches rustiques à croissance lente permet l'abattage des pintades à un âge proche de la maturité sexuelle.

La « Pintade de l'Ardèche » se caractérise par une viande ferme, peu grasse, un goût intense et une coloration foncée de la chair.

La « Pintade de l'Ardèche » se caractérise en outre par sa présentation :

- Seules les carcasses de classe A, c'est-à-dire sans trace de sang ni griffures, sont commercialisées en pièces entières.
- Traditionnellement, les carcasses vendues en pièces entières sous la dénomination « Pintade de l'Ardèche » sont présentées avec les tarses recourbés dans le coffre de la volaille, sous l'os du bréchet.
- En cas de découpe, les morceaux retenus doivent être conformes aux critères de présentation de la classe A. La découpe est exclusivement manuelle.

L'animal est abattu au minimum à 94 jours, pour un poids vif moyen de 1 kg 900.

Les différentes présentations des produits finis sont les suivantes :

|  |
|--|
| Effilée (poids minimum de carcasse = 1.1 Kg)   |
| Prête à Cuire avec tarses (poids minimum de carcasse éviscérée sans abat = 0.880 Kg) |
| Découpée   |

Ces viandes sont présentées fraîches ou surgelées.

### **3) DÉLIMITATION DE L'AIRE GÉOGRAPHIQUE**

L'élevage de la « Pintade de l'Ardèche » est réalisé dans l'aire géographique définie. La phase d'élevage correspond à la période comprise entre la mise en place des poussins d'un jour en élevage et l'enlèvement des volailles à destination de l'abattoir.

L'aire géographique de la « Pintade de l'Ardèche » est centrée sur le massif montagneux d'Ardèche (les monts du Vivarais) dans le Centre-Est du Massif central.

Elle est exclusivement constituée de communes situées en zone de montagne ou de piémont.

Cette zone est comprise dans le périmètre suivant :

- Frontière Est : le fleuve du Rhône (ouvrant sur la vallée du Rhône puis le massif du Vercors) ;
- Frontière Ouest : le fleuve de la Loire (ouvrant sur les monts du Velay) ;
- Frontière Nord : la rivière du Gier (ouvrant sur les monts du Lyonnais) ;
- Frontière Sud : la route nationale 102. Cette délimitation correspond aussi à l'une des bordures montagneuses du Massif central, et plus précisément des Monts du Vivarais.

L'aire géographique s'étend sur une surface d'environ 1800 km<sup>2</sup>.

L'aire géographique de la « Pintade de l'Ardèche » est composée du territoire des 365 communes suivantes situées sur les départements l'Ardèche, la Loire et la Haute-Loire :

Département de l'Ardèche (07) :

Accons, Aizac, Ajoux, Alba-la-Romaine, Albon, Alboussière, Alissas, Andance, Annonay, Antraigues-sur-Volane, Arcens, Ardoix, Arlebosc, Arras-sur-Rhône, Asperjoc, Astet, Aubenas, Aubignas, Baix, Barnas, Le Béage, Beauchastel, Beauvène, Berzème, Boffres, Bogy, Borée, Bozas, Boucieu-le-Roi, Boulieu-lès-Annonay, Brossainc, Burzet, Chalencou, Le Chambon, Champagne, Champis, Chanéac, Charmes-sur-Rhône, Charnas, Châteaubourg, Châteauneuf-de-Vernoux, Cheminas, Le Cheylard, Chirols, Chomérac, Colombier-le-Cardinal, Colombier-le-Jeune, Colombier-le-Vieux, Cornas, Coucouron, Coux, Le Crestet, Creysseilles, Cros-de-Géorand, Cruas, Darbres, Davézieux, Désaignes, Devesset, Dornas, Dunières-sur-Eyrieux, Eclassan, Empurany, Étables, Félines, Flaviac, Freyssenet, Genestelle, Gilhac-et-Bruzac, Gilhoc-sur-Ormèze, Gluiras, Glun, Gourdon, Guilherand-Granges, Intres, Issamoulenc, Issanlas, Issarlès, Jaunac, Juvinas, Labastide-sur-Bésorgues, Labatie-d'Andaure, Labégude, Le Lac-d'Issarlès, Lachamp-Raphaël, Lachapelle-Graillouse, Lachapelle-sous-Chanéac, Lafarre, Lalevade-d'Ardèche, Lalouvesc, Lamastre, Lanarce, Lavillatte, Lavilledieu, Laviolle, Lemps, Lespéron, Limony, Lussas, Lyas, Marcols-les-Eaux, Mariac, Mars, Mauves, Mayres, Mazan-l'Abbaye, Mercuer, Meyras, Meysse, Mézilhac, Mirabel, Monestier, Montpezat-sous-Bauzon, Nonières, Nozières, Les Ollières-sur-Eyrieux, Ozon, Pailharès, Peaugres, Péreyres, Peyraud, Plats, Pont-de-Labeaume, Pourchères, Le Pouzin, Prades, Pranles, Préaux, Privas, Quintenas, Rochemaure, Rochepaule, Rochessauve, La Rochette, Roiffieux, Rompon, Le Roux, Sagnes-et-Goudoulet, Saint-Agrève, Saint-Alban-d'Ay, Saint-Andéol-de-Fourchades, Saint-Andéol-de-Vals, Saint-André-en-Vivarais, Saint-Apollinaire-de-Rias, Saint-Barthélemy-le-Meil, Saint-Barthélemy-Grozon, Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Basile, Saint-Bauzile, Saint-Christol, Saint-Cierge-la-Serre, Saint-Cierge-sous-le-Cheylard, Saint-Cirgues-en-Montagne, Saint-Clair, Saint-Clément, Saint-Cyr, Saint-Désirat, Saint-Didier-sous-Aubenas, Saint-Étienne-de-Boulogne, Saint-Étienne-de-Serre, Saint-Étienne-de-Valoux, Sainte-Eulalie, Saint-Félicien, Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, Saint-Genest-Lachamp, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Germain, Saint-Gineis-en-Coiron, Saint-Jacques-d'Atticieux, Saint-Jean-Chambre, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Jean-le-Centenier, Saint-Jean-Roure, Saint-Jeure-d'Andaure, Saint-Jeure-d'Ay, Saint-Joseph-des-Bancs, Saint-Julien-Boutières, Saint-Julien-du-Gua, Saint-Julien-du-Serre, Saint-Julien-en-Saint-Alban, Saint-Julien-Labrousse, Saint-Julien-le-Roux, Saint-Julien-Vocance, Saint-Lager-Bressac, Saint-Laurent-du-Pape, Saint-Laurent-sous-Coiron, Saint-Marcel-lès-Annonay, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Valamas, Saint-Martin-sur-Lavezon, Saint-Maurice-en-Chalencou, Saint-Michel-d'Aurance, Saint-Michel-de-Boulogne, Saint-Michel-de-Chabrilanoux, Saint-Péray, Saint-Pierre-de-Colombier, Saint-Pierre-la-Roche, Saint-Pierre-sur-Doux, Saint-Pierreville, Saint-Pons, Saint-Priest, Saint-Privat, Saint-Prix, Saint-Romain-d'Ay, Saint-Romain-de-Lerps, Saint-Sauveur-de-Montagut, Saint-Sylvestre, Saint-Symphorien-sous-Chomérac, Saint-Symphorien-de-Mahun, Saint-Victor, Saint-Vincent-de-Barrès, Saint-Vincent-de-Durfort, Sarras, Satillieu, Savas, Sceautres, Sécheras, Serrières, Silhac, Soyons, Talencieux, Le Teil, Thorrenc, Thueyts, Toulaud, Tournon-sur-Rhône, Ucel, Usclades-et-Rieutord, Vals-les-Bains, Vanosc, Vaudevant, Vernosc-lès-Annonay, Vernoux-en-Vivarais, Vesseaux, Veyras, Villeneuve-de-Berg, Villevocance, Vinzieux, Vion, Vocance, La Voulte-sur-Rhône.

Département de la Loire (42) :

Le Bessat, Bessey, Bourg-Argental, Burdignes, La Chapelle-Villars, Châteauneuf, Chavanay, Chuyer, Colombier, Doizieux, Farnay, Graix, La Grand-Croix, L' Horne, Jonzieux, Lorette, Lupé, Maclas, Malleval, Marlhes, Pavezin, Pélussin, Planfoy, Rive-de-Gier, Roisey, Saint-Appolinard, Saint-Chamond, Sainte-Croix-en-Jarez, Saint-Genest-Malifaux, Saint-Julien-Molin-Molette, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Paul-en-Jarez, Saint-Pierre-de-Boeuf, Saint-Régis-du-

Coin, Saint-Romain-les-Atheux, Saint-Sauveur-en-Rue, Tarentaise, La Terrasse-sur-Dorlay, Thélis-la-Combe, La Valla-en-Gier, Véranne, Vérin, La Versanne.

Département de la Haute-Loire (43) :

Alleyrac, Araules, Arzac-en-Velay, Aurec-sur-Loire, Bas-en-Basset, Beaulieu, Beaux, Beauzac, Bessamoret, Blavozy, Le Brignon, Brives-Charensac, Chadron, Chamalières-sur-Loire, Le Chambon-sur-Lignon, Champclause, La Chapelle-d'Aurec, Chaspinhac, Chaudeyrolles, Chenereilles, Coubon, Cussac-sur-Loire, Dunières, Les Etables, Fay-sur-Lignon, Freycenet-la-Cuche, Freycenet-la-Tour, Goudet, Grazac, Lantriac, Lapte, Laussonne, Lavoûte-sur-Loire, Malvers, Malvalette, Le Mas-de-Tence, Mazet-Saint-Voy, Mézères, Monastier-sur-Gazeille, Monistrol-sur-Loire, Le Monteil, Montfaucon-en-Velay, Montregard, Montusclat, Moudeyres, Le Pertuis, Pont-Salomon, Présailles, Queyrières, Raucoules, Retournac, Riotord, Rosières, Saint-Bonnet-le-Froid, Saint-Didier-en-Velay, Saint-Étienne-Lardeyrol, Saint-Ferréol-d'Auroure, Saint-Front, Saint-Germain-Laprade, Saint-Hostien, Saint-Jeures, Saint-Julien-Chapteuil, Saint-Julien-du-Pinet, Saint-Julien-Molhesabate, Saint-Just-Malmont, Saint-Martin-de-Fugères, Saint-Maurice-de-Lignon, Saint-Pal-de-Mons, Saint-Pierre-Eynac, Saint-Romain-Lachalm, Sainte-Sigolène, Saint-Victor-Malescours, Saint-Vincent, Salettes, La Séauve-sur-Semène, Solignac-sur-Loire, Tence, Les Vastres, Les Villettes, Vorey, Yssingeaux.

**4) ÉLÉMENTS PROUVANT QUE LE PRODUIT EST ORIGINAIRE DE L'AIRE GÉOGRAPHIQUE**

Identification des opérateurs : tout opérateur intervenant dans les conditions de production de l'indication géographique protégée de la « Pintade de l'Ardèche » est tenu de s'identifier auprès du groupement en vue de son habilitation qui doit intervenir au plus tard avant le début de l'activité concernée.

A chaque étape de la filière, les différents opérateurs (couvoirs, organisation de production, éleveurs, abattoir, atelier de découpe) mettent en œuvre les moyens nécessaires à assurer la traçabilité des produits.

Le groupement travaille avec des opérateurs habilités et audités en externe par l'organisme certificateur qu'il a référencé.

Glossaire :

BL : bon de livraison

BEP : bon d'enlèvement partiel

Fiche ICA : fiche sanitaire

SB+ : numéro d'identification interne de lot de vif (chaque éleveur dispose d'un numéro unique qui lui est attribué).

DTS : Date limite de retrait

**ETAPES**

**Moyen Assurant la maîtrise de la traçabilité**

**ACCOUVEUR**

Bon de livraison oisillons

- Quantité et type d'oisillons livrés
- Coordonnées du couvoir, de l'éleveur
- Heure départ couvoir et arrivée élevage

N° de lot élevage

N° de BL oisillons

**ÉLEVEUR**

Fiche d'élevage

- Coordonnées de l'éleveur
- Couvoir d'origine des oisillons, quantité livrée, dates d'éclosion / livraison
- Mortalité journalière du lot
- Poids vif à différents stades d'élevage
- Produits vétérinaires utilisés, délais d'attente avant abattage
- Date du prélèvement « Salmonelles »
- Livraisons et stocks d'aliment
- N° d'homologation du cahier des charges concerné

N° de lot élevage

N° de BL d'aliment


Fiche ICA (envoyée à l'abattoir entre 5j et 48h avant abattage)

- Coordonnées de l'éleveur, l'organisation de production, le couvoir, le technicien, la firme d'aliment, le vétérinaire sanitaire et l'abattoir
- Identification du lot
- Mortalité du lot à différents stades d'élevage
- Poids vif à différents stades d'élevage
- Produits vétérinaires utilisés dans les 30 derniers jours d'élevage
- Résultat du prélèvement « Salmonelles »
- Date d'enlèvement

N° d'ordonnance

N° de lot élevage

**CHAUFFEUR DE RAMASSAGE VIF**



Bon d'enlèvement partiel

- Date d'enlèvement
- Heure de départ de l'élevage et d'arrivée à l'abattoir
- Nombre de volailles enlevées + ticket de pesée
- Coordonnées de l'éleveur, de l'abattoir
- Identification du lot
- Contrôle à réception à l'abattoir

N° de lot élevage

N° de BEP

**RESPONSABLE TRACABILITE**

Logiciel « Achat vif »  
Correspondance n° de lot élevage / n° SB+ (N° d'abattage)

N° de lot élevage

N° SB+

**RESPONSABLE DE L'ABATTOIR**

Fiche de fabrication à l'abattoir

- Date et heure de début et de fin d'abattage
- Nom de l'éleveur
- Type, nombre, poids vif des volailles
- Nombre et poids des volailles saisies / déclassées et étouffées en caisses
- N° de chariot, nombre et poids des volailles PAC, effilées, découpées, déclassées
- Température du bac d'échaudage
- Qualité du saignage, de l'effleurage, de la plumaison, du coupe-peau et arrachage du cou, de l'éviscération

N° SB+

Étiquette « Chariot de ressuage » ou « Stockage Vrac destiné à être retravaillé »

- Date abattage
- Nom de l'éleveur ou identification du lot si plusieurs lots élevage du même éleveur
- Type de volaille, nombre, poids
- Calibre
- Destination (découpe, PAC, effilé)
- N° de chariot

**RESPONSABLE « DÉCOUPE »**

**Étiquette « Convoyeur »**

- Date abattage
- Nom de l'éleveur ou identification du lot si plusieurs lots élevage du même éleveur
- Type de volaille, nombre, poids

**Fiche de suivi de production « découpe »**


- Date abattage, heure sortie ressuage
- Nom de l'éleveur
- Type de volailles
- Qualité du produit, nombre et poids des volailles saisies / déclassées
- Nombre de pièces, nombre d'équivalents volailles, poids
- Température à cœur de muscle

N° SB+

**Étiquette « Stockage Vrac »**

- Date abattage
- Nom de l'éleveur ou identification du lot si plusieurs lots élevage du même éleveur
- Type de volaille

Pièces entières destinées  
au conditionnement  
« PAC » ou « Effilée »



Étiquette colis (sur colis reçu par le client)

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| - Estampille vétérinaire      | - Désignation du produit, code article, nombre de pièces |
| - Date conditionnement et DLC | - Nom du transporteur, coordonnées du client             |
| - Lieu abattage               |  |

Remarque : L'ensemble des documents de traçabilité cités ci-dessus sont ceux en vigueur au jour de la rédaction du présent cahier des charges. Tout autre support ou système créé ultérieurement mais permettant d'enregistrer les informations exigées seront acceptés. Aucune forme particulière n'est exigée pour chacun de ces documents.

## **5) DESCRIPTION DE LA MÉTHODE D'OBTENTION DU PRODUIT**

### **5.1. Lieu d'élevage**

La « Pintade de l'Ardèche » est élevée dans l'aire géographique de l'IGP. L'ensemble des bâtiments et parcours est situé dans cette aire.

### **5.2. Souches utilisées**

Les souches utilisées sont des souches rustiques et doivent avoir la caractéristique d'être à croissance lente, ceci permettant d'abattre les pintades à un âge proche de l'âge de maturité sexuelle, gage d'une bonne qualité organoleptique.

Les souches utilisées doivent également être à forte mobilité car l'élevage de la « Pintade de l'Ardèche » se fait en plein air et en zone de montagne et piémont.

Les souches doivent également être des souches peu nerveuses. En effet, les stress climatiques de l'aire géographique entraînent de forts risques de piquage entre les sujets.

Les souches correspondant à ces critères et utilisées en 2011 par le Groupement de Qualité des Volailles Fermières de l'Ardèche sont les suivantes :

| <i>Souches utilisées</i>    | <i>Croisements obtenus</i> |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Souche Goubin, ISA</b>   | Croissance lente           |
| <b>Souche Beghin, Galor</b> |                            |

De nouvelles souches peuvent être introduites sur décision du groupement à condition d'appartenir au répertoire des croisements utilisables pour la production de volailles label rouge validé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, de répondre aux critères à respecter pour bénéficier de l'IGP et d'avoir fait l'objet d'essais sur le territoire de l'IGP mis en place par le Groupement de Qualité des Volailles Fermières de l'Ardèche.

### **5.3. Mode d'élevage**

La « Pintade de l'Ardèche » est élevée en plein air.



Afin de préserver le caractère traditionnel de la production, la densité des volailles en bâtiment et sur leur parcours de sortie est faible et la surface des bâtiments d'élevage est limitée (400 m<sup>2</sup> maximum).

Voici les valeurs cible des densités en bâtiment et sur leur parcours de sortie des volailles :

|                 | <i>En bâtiment</i>                   | <i>Sur parcours</i>                |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Pintades</b> | - 13 sujets maximum / m <sup>2</sup> | 2 m <sup>2</sup> minimum par sujet |

Les pintades doivent avoir accès à un parcours en plein-air à partir de 56 jours. Pour cela, les bâtiments sont munis de trappes ouvertes depuis 9 h du matin au plus tard jusqu'au crépuscule. En plein-air, les volailles peuvent ainsi être libres et pleinement exprimer leur comportement naturel, dans un environnement à la fois naturel et adapté à leurs besoins.

#### **5.4. Bâtiments et parcours d'élevage**

Les bâtiments sont adaptés pour respecter les densités citées plus haut. Ils sont soit construits en dur, en panneaux types « sandwich » ou arceaux bâchés. L'intégration dans le paysage est une priorité.

Les parcours sont recouverts de 30 arbres minimum d'essences locales pour 400 m<sup>2</sup> de bâtiment d'élevage. Ils permettent de pallier en partie aux stress climatiques car les volailles peuvent ainsi s'abriter à l'ombre et au frais en été et la vitesse des rafales de vent froid en hiver est amoindrie (source majoritaire de refroidissement des bâtiments).

L'utilisation d'essences locales permet aux sujets d'avoir accès à un milieu similaire à celui environnant les sites d'élevage dans l'aire géographique.

|                    |                        |  |
|--------------------|------------------------|--|
| <b>Acacia</b>      | <b>Chêne Pubescent</b> | <b>Peuplier</b>  |
| <b>Alisier</b>     | <b>Chêne Sessile</b>   | <b>Vergers agricoles, vignes, merisiers / cerisiers sauvages</b> |
| <b>Bouleau</b>     | <b>Frêne</b>           | <b>Épicéa</b>  |
| <b>Cèdre</b>       | <b>Hêtre</b>           | <b>Mélèze</b>  |
| <b>Châtaignier</b> | <b>Landes à Genêts</b> | <b>Pin Sylvestre</b>   |

Ce tableau ne répertorie que les principales espèces retrouvées naturellement ou traditionnellement en Ardèche. Les essences à utiliser sur le parcours de sortie des volailles sont composées de celles-ci ainsi que de toutes celles qui se développent à l'état naturel sur ou à proximité du parcours. Les parcours peuvent comporter des arbres d'essences non locales en sus des 30 arbres minimum d'essences locales prévus.

Les parcours de sortie des volailles de l'aire géographique disposent de « gritt » naturel, c'est-à-dire de petits cailloux à la surface du sol, issus de la dégradation de roches locales. Seuls les parcours présentant cette caractéristique sont sélectionnés pour l'IGP. L'unicité du massif montagneux permet de retrouver ces gritts sur l'ensemble de l'aire géographique définie.

### **5.5. Alimentation**

L'aliment de la « Pintade de l'Ardèche » est composé à 100% de végétaux, minéraux et vitamines dont 80% de céréales et produits dérivés de céréales en période d'engraissement (en moyenne pondérée à partir de 28 jours d'âge). Deux types de céréales au minimum sont présents dans les aliments. Les produits dérivés de céréales représentent au maximum 15% de l'ensemble céréales et produits dérivés de céréales. Le taux de matières grasses totales de l'aliment ne dépasse pas 6%.

Part de céréales dans l'alimentation de la « Pintade de l'Ardèche » :

- En phase de démarrage du 1er au 28ème jour maxi : 50 % minimum de céréales ;
- En phase d'engraissement du 29ème jour inclus à l'abattage : le pourcentage moyen pondéré de céréales et produits dérivés de céréales au stade de l'engraissement doit être supérieur ou égal à 80 %. Cette phase comprend la « période de « croissance » et de « finition ».

### **5.6. Lutte contre les maladies**

La zone géographique de montagne et piémont peu dense en élevage limite de façon notoire les risques de contamination d'un élevage à l'autre. C'est ce qui justifie en partie que l'aliment de la « Pintade de l'Ardèche » soit dénué de toute substance médicamenteuse, y compris de coccidiostatiques. Seuls les régulateurs de flore naturels sont autorisés.

Les éleveurs respectent un plan de prophylaxie préventif rigoureux et complet par rapport aux besoins des élevages, et basé sur une lutte biologique (vaccinations) contre les principaux agents pathogènes.

Ces pratiques sont en cohérence avec l'image naturelle qu'évoque la dénomination « Pintade de l'Ardèche ».

### **5.7. Transport et le ramassage des volailles**

La distance entre élevage et abattoir doit être inférieure à 100 km ou la durée de transport entre élevage et abattoir doit être inférieure à 3 heures.

Ce temps limité de transport permet d'atténuer le stress lié au transport en cage et favorise le bien être de l'animal. Ces paramètres influencent également la qualité du saignage donc celle de la carcasse (absence de tâche de sang sur le filet et piquage aux extrémités des ailes).

### **5.8. Présentation des produits**

Traditionnellement, les carcasses vendues en pièces entières sous la dénomination « Pintade de l'Ardèche » sont présentées avec les tarses recourbés dans le coffre de la volaille, sous l'os du bréchet.

Historiquement et pour répondre à la demande de clients des réseaux traditionnels de commercialisation (bouchers, détaillants, grossistes), la découpe des carcasses des volailles vendues sous la dénomination « Pintade de l'Ardèche » est manuelle.

Cette découpe exclusivement manuelle permet d'obtenir des pièces avec une présentation parfaite qui ne pourrait être obtenue par procédés mécaniques :

- Possibilité de réaliser des suprêmes (filet + ailes) de tout grammage pour la clientèle de la restauration ;
- Possibilité de réaliser des filets simples avec peau sans déchirure pour la clientèle des boucheries traditionnelles ;
- Déjointage (haut de cuisse arrondie) manuel de la cuisse (absence de la partie de dos).

## **6) ÉLÉMENTS JUSTIFIANT LE LIEN AVEC LE MILIEU GÉOGRAPHIQUE**

### **6.1. Spécificité de l'aire géographique**

#### **6.1.1. Facteurs naturels**

##### La topographie

L'aire géographique de la « Pintade de l'Ardèche » est le massif des monts du Vivarais, unité montagneuse située essentiellement en Ardèche, mais débordant aussi sur la partie Est de la Haute-Loire et le Sud de la Loire.

Le massif du Vivarais est un massif hercynien, c'est-à-dire de la période géologique d'orogénèse s'étalant du Dévonien (-400 millions d'années) au Permien (-245 millions d'années). Il a été créé par le soulèvement puissant des Alpes à l'Est et celui des Pyrénées au Sud.

Une des caractéristiques de l'aire géographique de la « Pintade de l'Ardèche » est donc d'être constituée exclusivement de communes situées en zone de montagne et de piémont.

Les zones de montagne se définissent comme se caractérisant par des handicaps liés à l'altitude, à la pente et / ou au climat, qui ont pour effet de restreindre de façon conséquente les possibilités d'utilisation des terres et d'augmenter de manière générale le coût de tous les travaux. Le critère moyen d'altitude est de 700 mètres. Concernant la déclivité, 80 % minimum de la surface de la commune doit posséder des pentes de plus de 20 %.

Les zones de piémont sont situées en contiguïté des zones de montagne, en ayant un caractère montagneux atténué mais un handicap naturel suffisant pour que l'activité agricole y soit extensive.

##### Le climat

Le climat de l'aire géographique est un climat de moyenne montagne à continental, contrasté selon les saisons :

- Des hivers rudes : en hiver sur l'aire géographique, les conditions climatiques sont rigoureuses. Effectivement, les cumuls de neige sont importants et les températures moyennes sont particulièrement basses.
- Des étés ensoleillés, doux et secs, marqués par un fort ensoleillement et des températures d'altitude assez chaudes, même si elles restent plus fraîches qu'en plaine. Concernant les faibles précipitations, elles se font en majorité sous forme d'orage, le soir.

- Des saisons intermédiaires très brèves : la transition entre le climat d'hiver et le climat d'été est rapide avec des gelées tardives et des débuts de chaleur précoces au printemps, et vice-versa à l'automne.
- Un environnement venté : le vent du Sud et le vent du Nord peuvent être assez violents et destructeurs tout au long de l'année. En tout état de cause, quelle qu'en soit la direction, rares sont les jours sans vent. En hiver, on note notamment les phénomènes de « burle », c'est-à-dire un vent tourbillonnant et glacial venant du Nord-Ouest, pendant ou après les chutes de neige, soulevant la partie supérieure de la couverture de neige et entraînant la formation de congères.

#### La pédologie, spécificité des sols de l'aire géographique

L'aire géographique se caractérise par des sols formés à partir de roches éruptives anciennes (basaltes issus de nombreux anciens volcans), granites et schistes. Le point commun de ces roches est d'être dures mais facilement délitables, ce qui entraîne la présence de très nombreux petits cailloux sur le sol des parcours de sortie des volailles.

En bordure de l'aire géographique on retrouve du calcaire et de la craie (mélange de calcaire et d'argile). Ces roches sont également friables mais en particules beaucoup plus fines que celles précédemment citées, donc ne correspondent pas au gritt que l'on recherche. En effet, le gritt est défini par des particules de roches érodées ayant une taille de 1 à 5 millimètres, assez dures pour être difficilement solubles dans le gésier des volailles.

En conclusion, les conditions naturelles de l'aire géographique sont marquées par un relief accidenté, des terrains caillouteux, connaissant des variations climatiques importantes accentuées par la présence de vent. Ceci a limité l'intensification de la production agricole et a permis le développement d'une aviculture traditionnelle de qualité.

#### **6.1.2. L'agriculture ardéchoise et le développement de l'aviculture. L'histoire et les facteurs humains de l'aire géographique de la « Pintade de l'Ardèche »**

L'exode rural a fortement marqué l'agriculture ardéchoise. Depuis le début du XX<sup>ème</sup> siècle, la population rurale ardéchoise a quitté les hauts pays où la natalité restait forte pour gagner les vallées. C'est là que la génération suivante a pris son essor vers les villes extérieures : Valence, Lyon ou Marseille, ou s'est orientée vers l'industrie.

Petit à petit les campagnes se sont vidées. L'Ardèche est une zone peu densément peuplée : 53 habitants/km<sup>2</sup> alors que la moyenne nationale est de 110 habitants/km<sup>2</sup>. Seuls les producteurs ayant l'amour de leur terroir sont restés au pays. C'est justement avec ces éleveurs là que progressivement le Groupement de Qualité des Volailles Fermières de l'Ardèche va se créer. Le groupement va représenter au milieu de ce « soit disant désert », une oasis porteuse de développement rural, de fixations des populations agricoles, de régénérescence des vocations.

Il faut remonter en 1964 pour découvrir les premières tentatives d'organisation de la production avicole en Ardèche. La définition de l'aire géographique de production des Volailles Fermières de l'Ardèche s'est faite naturellement à partir de 1985, date à laquelle a été formé le « Syndicat de Défense des Volailles Fermières de l'Ardèche » puis en parallèle au développement du groupement. Les événements historiques justifiant le développement de la production des Volailles Fermières de l'Ardèche sont synthétisés ci-dessous :

- 1964 : Présence d'une tuerie permettant l'abattage de volailles et de lapins à Félines. Ce village se situe sur le canton de Serrières, canton localisé au nord de l'Ardèche. Quelques agriculteurs

des alentours assurent l'approvisionnement de ce site d'abattage. Ces volailles sont collectées par un 'coquetier' qui se déplace de ferme en ferme.

- 1975 : Construction d'un abattoir familial (volailles, lapins et chevreaux) à l'extérieur du village de Félines : l'abattoir Barou. Une quinzaine de producteurs possédant des bâtiments ayant une surface inférieure à 200 m<sup>2</sup> assurent l'approvisionnement de l'abattoir.
- 1985 : Le véritable essor de l'aviculture se concrétise à cette période lorsque des agriculteurs en recherche d'une nouvelle production se sont pris en main dans le secteur de Lamastre et ont créé la « confrérie des volailles fermière de l'Ardèche et du Haut-vivarais » ainsi que le « Syndicat de Défense des Volailles Fermières de l'Ardèche » (aujourd'hui nommé Groupement de Qualité des Volailles Fermières de l'Ardèche). Petit à petit, le travail réalisé par le groupement va permettre l'adhésion de nouveaux producteurs.
- 1987 : le groupement obtient le Label Rouge, signe officiel de qualité identifiant des produits de qualité supérieure, pour la pintade (homologation 02-87).

Le positionnement de l'aire géographique de production sur les départements limitrophes à l'Ardèche s'explique par le fait que l'abattoir se situe à la pointe Nord du département. En effet, les distances à 'vol d'oiseaux' entre Félines et les villages les plus proches des départements limitrophes sont très faibles.

La volaille est surtout élevée dans de petites exploitations de type familial pratiquant une agriculture peu intensive. Bien souvent, c'est l'épouse de l'éleveur qui s'occupe des volailles. La production avicole représente tout de même la deuxième production animale ardéchoise après l'élevage ovin et caprin. Les exploitations ardéchoises sont généralement de petite taille : 61 et 86 % des exploitations ont, respectivement, une surface inférieure à 20 et 50 hectares (Source : « Mémento agricole et rural »).

Une typologie des exploitations produisant la « Pintade de l'Ardèche » permet de caractériser leurs systèmes de production :

- La présence de petites exploitations au sein de l'aire géographique. En moyenne la surface des sites est de 35 hectares ;
- La part importante du revenu dégagé par l'élevage de volailles. Cette dernière représente 45 % du revenu de l'exploitation ;
- La pluriactivité de l'activité de chaque site (volailles, arboriculture, fruits rouges, lentilles).

Certains éleveurs peuvent pratiquer trois voire quatre activités. Parmi l'ensemble des activités complémentaires, la volaille est celle qui dégage le plus de revenu. En effet, contrairement aux autres, le revenu de cette dernière subit moins les conditions extérieures notamment grâce aux adaptations qu'ont pu apporter les éleveurs. Cela a pris une importance capitale au cours des dernières années.

Paradoxalement, les contraintes subies par l'agriculture ardéchoise ont permis le développement de cette production de volailles traditionnelles élevées en plein air :

Dans un contexte de milieu naturel peu propice au développement de cultures ou d'élevage intensif, et de terres disponibles peu étendues, la production de volailles fermières en plein air s'est imposée aux producteurs locaux car elle présentait les caractéristiques suivantes :

- une production qui nécessite peu d'investissements et à cycle court ;
- une production qui laisse de la disponibilité pour les autres ateliers de l'exploitation. L'agriculture ardéchoise étant basée sur la polyculture et l'élevage, les facteurs 'temps' et 'facilité d'organisation' sont primordiaux ; l'éleveur doit pouvoir consacrer du temps à ces différentes productions au cours de la journée.

- Une production de qualité adaptée à la valorisation de terrains accidentés, s'accommodant de variations climatiques et correspondant à la philosophie des producteurs locaux, soucieux de préserver des modes de production familiaux et traditionnels.

En conclusion, les facteurs humains marquants de la production de la « Pintade de l'Ardèche » sont :

- le développement d'une production de volailles depuis les années 60, en rayonnement autour d'une tuerie puis d'un abattoir familiaux situés dans la région de Serrières, dans le nord Ardèche ;
- des exploitations familiales de petite taille, en polyculture élevage ayant développé une production de volailles traditionnelles de qualité, qui correspondait à leurs structures d'exploitation, à leurs terres difficiles et à leurs ambitions de qualité de produit ;
- l'implication forte d'un groupement d'éleveurs dans le développement de la filière, la défense et la promotion du produit, le suivi de la qualité et la mise en place de signes officiels de qualité.

## **6.2. Spécificité du produit**

La spécificité de la « Pintade de l'Ardèche » repose à la fois sur la réputation de ce produit, et sur les savoir faire d'élevage et de préparation de celui-ci.

### **6.2.1. Réputation de la « Pintade de l'Ardèche »**

Dès 1964, la famille Barou à l'origine de l'abattoir d'origine de la filière utilise la dénomination « Le Coq'Ardéchois » pour commercialiser ses volailles.

Depuis les années 80, les éleveurs ont su assurer la promotion des volailles fermières de l'Ardèche et les mettre en valeur. Le sentiment des éleveurs était le suivant « nous sommes dans un département montagnoux avec des zones difficiles, toutefois nous devons passer ce handicap, pour cela nous devons mettre en valeur notre production et notre territoire, nous devons être capable de vendre l'Ardèche ! ».

Ainsi, les éleveurs ont créé, en 1985, la confrérie des volailles fermières de l'Ardèche et du Haut Vivarais, destinées à mettre en valeur leur production autour des thèmes gastronomie, tourisme et culture. Cette confrérie avait pour but de : promouvoir les volailles fermières ardéchoises qui sont le produit d'un terroir et de participer au rayonnement régional en faisant apprécier, les sites, monuments, traditions et folklore qui sont l'expression d'une entité ardéchoise, au travers de manifestations culturelles et artistiques.

En parallèle, en 1985, un syndicat de défense a été créé, il s'agissait du syndicat de défense des volailles fermières de l'Ardèche, qui depuis 2000 est devenu le Groupement de Qualité des Volailles Fermière de l'Ardèche. Celui-ci s'occupe de la gestion des cahiers des charges qualitatifs et du suivi de la production.

Les efforts des éleveurs ont été récompensés par plusieurs médailles au concours général agricole :

| Année | Médailles          | Type de production                     |
|-------|--------------------|--|
| 1993  | Médaille d'Or      | Pintade de l'Ardèche éviscérée         |
| 1994  | Médaille de Bronze | Pintade de l'Ardèche saignée éviscérée |
| 1996  | Médaille de Bronze | Pintade de l'Ardèche saignée éviscérée |
| 1997  | Médaille de Bronze | Pintade de l'Ardèche saignée éviscérée |

Le groupement des volailles fermières de l'Ardèche représente en 2010, sur l'aire géographique de l'IGP :

- 99 éleveurs ;
- 62179 M2 de bâtiments pour 159 bâtiments ;
- 265 000 « Pintade de l'Ardèche » abattues sur l'année 2010 (environ 5000 pintades / semaine, mises en place).

Depuis 2008, le groupement s'est engagé dans une démarche volontaire d'animation réalisée en magasin, permettant d'impliquer 15 éleveurs avec plus de 130 journées d'animation réalisées. Le dynamisme de ces éleveurs notamment les plus jeunes est encouragé par la Région Rhône-Alpes via l'AFIVOL (association filière volaille en Rhône-Alpes).

#### Des évolutions orientées vers plus de nature!

Le groupement teste actuellement sur une vingtaine de bâtiments d'élevage l'utilisation de tanin de châtaigner dans l'alimentation des poulets, pintades et chapons pour lutter contre le développement des coccidies pathogènes et renforcer leur intégrité intestinale. Le châtaigner est un arbre très répandu et réputé en Ardèche, à la base de nombreuses utilisations (recettes culinaires traditionnelles, bois, tanin, etc....).

#### **6.2.2. Les spécificités de l'élevage et de la préparation de la « Pintade de l'Ardèche »**

La « Pintade de l'Ardèche » bénéficie d'un mode d'élevage fermier – élevé en plein air.

Elle est produite à partir de souches rustiques, à forte mobilité, adaptées à la vie en plein air, ce qui lui permet d'exploiter les parcours accidentés que l'on trouve généralement dans l'aire géographique. Les souches retenues par le groupement sont aussi des souches peu nerveuses, résistantes aux stress climatiques de l'aire géographique qui pourraient sinon entraîner des risques de piquages. Ces souches sont en outre à croissance lente permettant l'abattage des animaux à un âge plus élevé que la moyenne, soit 94 jours minimum, ce qui est un gage de bonnes qualités organoleptiques.

Les parcours utilisés, en libre accès à partir du 56<sup>ème</sup> jour d'élevage, sont arborés et comprennent en particulier au moins 30 arbres d'essences locales pour 400 M2 de bâtiment. Ces arbres permettent d'assurer l'abri des volailles contre le soleil en été et limitent la force du vent. Ils favorisent ainsi la sortie des animaux et leur santé car les pintades (animaux qualifiés de craintifs) occupent la majeure partie du terrain et s'éloignent du bâtiment, les arbres ayant un effet rassurant contre les prédateurs tels que les rapaces. L'utilisation d'arbres d'essences locales permet de reproduire dans

les parcours les paysages ardéchois présents alentour. Le caractère accidenté de l'aire géographique se retrouve aussi dans les parcours. La présence de parcours en pente favorise le développement des muscles supérieurs, au niveau des cuisses notamment, ainsi que l'élimination de graisses.

Ces parcours comprennent en outre un gritt naturel issu de la dégradation des roches typiques de l'aire géographique : roches éruptives anciennes (basaltes issus de nombreux anciens volcans), granites et schistes. Le gritt est formé de particules de roches érodées ayant une taille de 1 à 5 millimètres, assez dures pour être difficilement solubles dans le gésier des volailles. Ces petites pierres vont se stocker dans le gésier des volailles permettant un meilleur broyage mécanique des aliments et une meilleure assimilation de ceux-ci. Via son action mécanique, ces pierres vont permettre de muscler le gésier (ce qui se traduira par des gésiers de grosse taille). Ceci évite bon nombre de maladies d'ordre digestif.

L'alimentation distribuée à la « Pintade de l'Ardèche » est riche en céréales et produits dérivés de céréales : au moins 50 % du 1<sup>er</sup> au 28<sup>ème</sup> jour puis 80 % minimum. Cet apport en céréales correspond aux pratiques traditionnelles des éleveurs ardéchois qui avaient pour habitude de compléter la ration apportée par les parcours par des céréales de l'exploitation produites sur les quelques parcelles de terres cultivables. Ce fort de taux de céréales est important pour le dépôt du gras intramusculaire et donc les caractéristiques gustatives de la viande.

Afin de préserver le caractère extensif de la production jusque dans la lutte contre les maladies, les éleveurs n'utilisent pas de compléments médicamenteux dans les aliments mais pratiquent des vaccinations et l'utilisation d'extraits végétaux. Ceci a semblé important au groupement pour que cet élevage soit en accord avec l'image de l'Ardèche qui est un territoire alliant paysages naturels et productions variées.

La distance entre élevage et abattoir doit être inférieure à 100 km ou la durée de transport entre élevage et abattoir doit être inférieure à 3 heures. Ce temps limité de transport permet également d'atténuer le stress lié au transport en cage et favorise le bien être de l'animal. Ces paramètres influencent également la qualité du saignement donc celle de la carcasse (absence de tâche de sang sur le filet et piquage aux extrémités des ailes).

Des spécificités sont aussi à souligner dans le mode de préparation des volailles pour la commercialisation.

Les carcasses de la « Pintade de l'Ardèche » vendues en pièces entières sont présentées traditionnellement avec les tarses recourbées dans le coffre de la volaille, sous l'os du bréchet.

Les avantages de la présentation avec tarses de la « Pintade de l'Ardèche » sont les suivants :

- Tenue à la cuisson supérieure à celle d'un produit sans tarses notamment lors des opérations de « farcissage » ;
- Présentation finale du produit aux clients optimisée puisque la présence de tarses confère un aspect plus « rebondie » à la pintade mettant nettement en valeur les filets qui généralement sont plus saillants.

Comme le faisaient autrefois les petits abattoirs régionaux et particulièrement la maison Barou dès le départ dans les années 70, sur l'aire géographique, la découpe des carcasses est manuelle.

Ceci permet d'élaborer des produits finis de haute qualité, puisque la découpe manuelle a l'avantage d'être plus précise et nette que la découpe automatisée :

- choix de la hauteur de découpe selon la conformation de chaque carcasse optimisant la découpe des mâles comme celles des femelles ;
- pas de présence de sciure d'os ;



- contrôle visuel plus prononcé des pièces de découpes au moment de leur élaboration (le personnel assurant le tri sélectif).

Historiquement, l'élaboration de produits de qualité supérieure correspond à la demande de clients des réseaux traditionnels de commercialisation (bouchers, détaillants, grossistes) qui recherchent encore un produit non mécanique et à valeur ajoutée supérieure.

### **6.2.3. Une qualité organoleptique particulière**

Le groupement effectue chaque année des tests organoleptiques de ses produits. Outre un niveau de satisfaction élevée (au moins 70 % de consommateurs trouvant ces produits 'satisfaisants' à 'irréprochables'), ceux-ci ont permis de mettre en évidence les caractéristiques suivantes pour la « Pintade de l'Ardèche » :

- sa chair est plus ferme que celle des autres produits équivalents, tant au niveau des muscles blancs (filets) que rouges (cuisses) ;
- la viande a un goût plus intense et une coloration de la chair foncée et une coloration jaune de la peau.

### **6.3. Lien causal entre l'aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit**

L'aire géographique de la « Pintade de l'Ardèche » est un territoire de montagne ou de piémont peu propice au développement d'une agriculture intensive. Les paysages sont marqués par une alternance d'espaces naturels et d'espaces agricoles à vocations variées : élevage, arboriculture, petits-fruits, viticulture, châtaigniers.

L'agriculture ardéchoise est donc basée sur la polyculture et l'élevage : productions laitière et fruitière notamment. Elle est caractérisée par des exploitations de taille limitée utilisant bien souvent peu de surfaces planes et mécanisables.

Dans un contexte d'exode rural et de déprise agricole, les exploitants se sont orientés vers des productions diversifiées permettant à la fois : de valoriser les terrains accidentés de l'aire géographique, de résister aux conditions climatiques rudes avec des contrastes thermiques importants accentués par le vent, d'organiser la charge de travail dans la journée et au cours des saisons, et de correspondre à l'aspiration des producteurs locaux à la production de qualité. La production de volailles de chair à la fois traditionnelles et de qualité s'est imposée comme répondant à ces différents objectifs.

Elle s'est développée dans les exploitations en partant du nord de l'Ardèche, sur l'initiative d'une famille de coquetiers puis d'abatteurs : la famille Barou. Encore en construction dans les années 60, la filière s'est rapidement organisée en un groupement en 1985 et les éleveurs ont rejoint celui-ci en nombre. Aujourd'hui la production avicole représente la deuxième production animale ardéchoise et au sein des exploitations du groupement elle représente plus de 40 % des revenus.

Afin de préserver le caractère traditionnel de l'élevage avicole, les éleveurs se sont orientés vers un mode de production fermier et un élevage en plein air des animaux. Pour cela, les densités sont limitées à la fois dans les bâtiments et sur les parcours. L'alimentation des animaux est basée sur une forte proportion de céréales. En outre, l'accès libre à un parcours arboré est garanti pour les volailles. Afin de permettre aux volailles de valoriser les parcours à la fois accidentés et soumis aux aléas climatiques locaux, les éleveurs se sont imposés l'implantation de nombreux arbres, encourageant ainsi à la fois la sortie des animaux et leur mobilité et les préservant du soleil et du

vent. Ils ont aussi choisi des souches adaptées aux conditions naturelles : peu nerveuses, rustiques et mobiles.

Les parcours utilisés par les volailles sont représentatives des paysages de l'aire géographique : souvent accidentés, plantés d'arbres d'essences correspondant aux paysages ardéchois et présentant un griff naturel issu de la dégradation des roches typiques de l'aire géographique : roches éruptives anciennes, granites et schistes. Les caractéristiques des parcours concourent au besoin d'exercice des animaux, à un appoint d'alimentation (herbes, insectes), et à leur bien-être digestif car il leur procure un griff nécessaire à la bonne digestion des aliments.

L'utilisation de souches rustiques à croissance lente, le choix d'une alimentation à fort taux de céréales et l'utilisation de parcours représentatifs des paysages locaux ardéchois permettent de produire des volailles aux qualités gustatives reconnues, en particulier pour la fermeté de leur chair et leur goût intense.

En outre, le choix du groupement de préserver des modes de présentation et de découpe traditionnels permettent à ces volailles d'être appréciés dans un large quart sud est de la France.

La production de « Pintade de l'Ardèche » est intimement liée à celle des « Poulet de l'Ardèche » / « Chapon de l'Ardèche ».

## **7) RÉFÉRENCES CONCERNANT LA STRUCTURE DE CONTRÔLE**

La conformité de la « Pintade de l'Ardèche » au présent cahier des charges est contrôlée par :

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Immeuble Le Guillaumet

60, Avenue du Général de Gaulle

92046 LA DEFENSE CEDEX

Tel : 01 41 97 00 74

Fax : 01 41 97 08 32

Cet organisme est accrédité conformément à la norme EN 45011.

## **8) ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DE L'ÉTIQUETAGE**

Les étiquettes doivent obligatoirement comporter :

- La dénomination : « Pintade de l'Ardèche » ;
- Le symbole IGP de l'Union européenne ;
- L'identification de l'abattoir avec un étiquetage spécifique (estampille CEE) ou sur l'étiquette poids/prix apposée sur le produit à côté de l'étiquetage informatif.

## 9) EXIGENCES NATIONALES

| Principaux points à contrôler   | Méthode d'évaluation  |
|---|---|
| <b>Aire géographique</b>  |   |
| Elevage dans l'aire géographique définie  | Vérification documentaire et visuelle   |
| <b>Elevage de type fermier / plein air</b>  |   |
| Présence de souches rustiques à croissance lente  | Documentaire (tableaux des souches autorisées)  |
| Présence de faibles densités d'élevage (13 Pintades / m <sup>2</sup> maximum). Elevage dans des bâtiments de 400m <sup>2</sup> maximum. | Vérification visuelle et documentaire sur site  |
| Elevé en plein air avec accès à un parcours avec des densités minimum pour les volailles ( 2 m <sup>2</sup> / Pintade)                  | Vérification visuelle et documentaire sur site  |
| <b>Présence d'arbres sur les parcours</b>   |   |
| Présence de 30 arbres minimum pour 400 m <sup>2</sup> de bâtiment   | Vérification visuelle sur site  |
| <b>Une alimentation saine</b>   |   |
| Une alimentation 100 % végétale, minéraux et vitamines dont 80 % minimum de céréales  | Vérification documentaire   |
| Présence d'une alimentation sans supplémentation médicamenteuse ou coccidiostatique   | Vérification documentaire   |
| <b>Suivi sanitaire</b>  |   |
| Suivi sanitaire basé sur la prévention (réalisation de vaccins)   | Présence d'un plan de prophylaxie   |
| <b>Le produit</b>   |   |
| Age minimum à l'abattage de 94 Jours, favorisant la fermeté du produit  | Vérification documentaire à l'abattoir et respect des âges (planning/ Mises en place) |
| Commercialisation de volailles de classe A uniquement (sans trace de sang et de griffures)  | Vérification visuelle à l'abattoir par des opérateurs formés au retrait               |
| Découpe manuelle et bridage avec tarse à l'abattoir   | Règles définies sans dérogation, contrôle visuel sur produit fini.                    |
| Présence d'une viande :<br>- ferme<br>- chair colorée et peau jaune<br>- avec une intensité de goût plus forte                          | Vérification documentaire (tests organoleptiques)                                     |