ORDRE DE SERVICE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

Direction générale de l'alimentation

Sous-direction de la sécurité sanitaire des aliments

Bureau de Surveillance des Denrées Alimentaires
Adresse : 251, rue de Vaugirard
75 732 PARIS CEDEX 15
Dossier suivi par : S.FRANCART
Mél : Sylvie.Francart@agriculture.gouv.fr
Tél.: 01.49.55.81.55
Fax.: 01.49.55.84.23
Réf. interne : SDSSA/BSDA-AS/SF Mod N2007-8191

NOTE DE SERVICE
DGAL/SDSSA/N2007-8220
Date: 29 août 2007

Classement :SA-232.41

Date de mise en application : **Immédiate**
Abroge et remplace : **Néant**
Complète et modifie **DGAL/SDSSA/N2007- 8191**:
Nombre d'annexe :1
Degré et période de confidentialité : **Tout public**

Le Ministre de l'agriculture, de la pêche
à
(liste de diffusion)

Objet : Lutte contre les salmonelles dans les troupeaux de volailles Gallus gallus

Bases juridiques :

- Arrêté du 15 mars 2007 modifié le 23 juillet 2007 relatif à la lutte contre les infections à *Salmonella* Enteritidis, *Salmonella* Hadar, *Salmonella* Infantis, *Salmonella* Typhimurium ou *Salmonella* Virchow dans les troupeaux de l'espèce *Gallus gallus* en filière ponte d'œufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux ;

- Arrêté du 15 mars 2007 modifié le 23 juillet 2007 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow dans les troupeaux de reproduction de l'espèce *Gallus gallus* en filière chair et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux.

Résumé :

La présente note a pour objet de remplacer les annexes VI et VII de la note de service DGAL/SDSSA/N2007-8191 du 25 juillet 2007 suite à la modification des arrêtés du 15 mars 2007 susvisés en date du 23 juillet 2007, publiée le 9 août 2007.

MOTS-CLES : SALMONELLES, VOLAILLES, GALLUS GALLUS

Destinataires	
Pour exécution : - Directeurs départementaux des services vétérinaires	Pour information : - Préfets - DRAF DDAF - IGVIR - Directrice de la BNEVP - Directrice de l'ENSV - Directeur de l'INFOMA - Directeurs des ENV - DGCCRF - DGS

Je vous informe que les annexes VI et VII de la note de service DGAL/SDSSA/N2007-8191 du 25 juillet 2007 sont remplacées par celles jointes en annexe. Les modifications, liées aux arrêtés modificatifs ou à des précisions nécessaires, apparaissent en grisé.

Vous voudrez bien m'informer des difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de cette note de service.

La Directrice Générale Adjointe
C.V.O.

Monique ELOIT

Annexe

ANNEXE VI : Prélèvements obligatoires

1- Prélèvements sur volailles de reproduction en période d'élevage, filière chair-V2

semaines	*AM 26 octobre 1998*	AM 15 mars 2007
1 jour	*5 fonds de boites (1 éch)*	**5 fonds de boîtes (1 éch)** **et 5 fonds de boîtes conservés 8 semaines au laboratoire** **SE SI SH ST SV**
4	*60 fientes (1 éch)* *et 1 chiffonnette (1 éch)*	**SOL:** **3 paires de stéribottes (3 éch)** **et 2 chiffonnettes - envirt. (fientes) (2 éch)** **SE SI SH ST SV**
		BATTERIE: **3 chiffonnettes - tapis de fientes (3 éch)** **et 1 chiffonnette - fonds de cages (1 éch)** **et 1 chiffonnette - envirt. (fientes) (1 éch)** **SE SI SH ST SV**
2 sem avant entrée en ponte ou transfert	*60 fientes (1 éch)* *et 1 chiffonnette (1 éch)*	**SOL:** **3 paires de stéribottes (3 éch)** **et 2 chiffonnettes - envirt. (fientes) (2 éch)** **SEROTYPAGE COMPLET MDO**
		BATTERIE: **3 chiffonnettes - tapis de fientes (3 éch)** **et 1 chiffonnette - fonds de cages (1 éch)** **et 1 chiffonnette - envirt. (fientes) (1 éch)** **SEROTYPAGE COMPLET MDO**

NB : Prélèvements pour les troupeaux en provenance d'un couvoir ayant reçu des œufs à couver d'élevages non adhérents à la Charte Sanitaire :

une chiffonnette de fond de casier d'éclosoir
et des papiers déposés sur le carrousel de tri
et recherche d'inhibiteurs dans un lot de 10 œufs à couver ou de 10 poussins d'un jour
SE SI SH ST SV

2- Prélèvements sur volailles de reproduction en période de ponte, filière chair-V2

semaines	AM 26 octobre 1998		AM 15 mars 2007	
	production	couvoir	production	couvoir
			entrée en ponte	
26 *au plus tard* (VS/ DDSV)	*60 fientes + 1 chiffonnette*		5 paires de stéribottes (2 éch) ou 2x150 g de fientes (cages) (2 éch) ou 300 fientes > 1g (2 éch) et 1 chiffonnette (1 ech) (VS/ DDSV) SE ST SH SI SV	
28		*1 chiffonnette ou 5 fonds d'éclosoir ou méconiums*		5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
30		*1 chiffonnette ou 5 fonds d'éclosoir ou méconiums*		5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
32		*1 chiffonnette ou 5 fonds d'éclosoir ou méconiums*		5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
34	*60 fientes + 1 chiffonnette*		2 paires de stéribottes (2 éch) ou 2 chiffonnettes (cages) (2 éch) et 1 chiffonnette (1 éch) SE ST SH SI SV	5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
36		*1 chiffonnette ou 5 fonds d'éclosoir ou méconiums* **		5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
38		*1 chiffonnette ou 5 fonds d'éclosoir ou méconiums*		5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
40		*1 chiffonnette ou 5 fonds d'éclosoir ou méconiums*		5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
42 (1) (VS/DDSV)	*60 fientes + 1 chiffonnette*		2 paires de stéribottes (2 éch) ou 2 chiffonnettes (cages) (2 éch) et 1 chiffonnette (1 éch) SE ST SH SI SV	5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) (VS/DDSV) SE ST SH SI SV
44		*1 chiffonnette ou 5 fonds d'éclosoir ou méconiums*		5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
46		*1 chiffonnete ou 5 fonds d'éclosoir ou méconiums*		5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
48		*1 chiffonnette ou 5 fonds d'éclosoir ou méconiums*		5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
50	*60 fientes + 1 chiffonnette*		2 paires de stéribottes (2 éch) ou 2 chiffonnettes (cages) (2 éch) et 1 chiffonnette (1 éch) SE ST SH SI SV	5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
52		*1 chiffonnette ou 5 fonds d'éclosoir ou méconiums*		5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
54		*1 chiffonnette ou 5 fonds d'éclosoir ou méconiums*		5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
56		*1 chiffonnette ou 5 fonds d'éclosoir ou méconiums*		5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
58 (1) (2) (VS/DDSV)	*60 fientes + 1 chiffonnette*		**Si abattage avant 65 semaines:** 5 paires de stéribottes (2 éch) ou 2x150 g de fientes (2 éch) ou 300 fientes (2 éch) et 1 chiffonnette (1 éch) (VS/DDSV) SEROTYPAGE COMPLET MDO	5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) (VS/DDSV) SE ST SH SI SV
			Sinon: 2 paires de stéribottes (2 éch) ou 2 chiffonnettes (cages) (2 éch) et 1 chiffonnette (1 éch)	
60 (2) (VS/DDSV)			**Si abattage après 65 semaines:** 5 paires de stéribottes (2 éch) ou 2x150 g de fientes (2 éch) ou 300 fientes (2 éch) et 1 chiffonnette (1 éch) (VS/DDSV) SEROTYPAGE COMPLET MDO	5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
62				5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
64				5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
66	*âge moyen d'abattage*			5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
68				5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV

(1) Les dates de prélèvements couvoir sont données à titre indicatif : l'arrêté et le règlement fixent 16 semaines d'écart entre les prélèvements des autorités sanitaires (VS/DDSV)

(2) 58 / 60 semaines est indicatif, le prélèvement officiel par le VS ou la DDSV est à réaliser "au cours des huit semaines précédant la fin du cycle de production". Le sérotypage complet est à réaliser lors de ce dernier contrôle DDSV/VS.

(3) 250 g de coquilles constitués de 25 unités de 10 g de coquilles d'œufs brisés provenant de 25 paniers d'éclosoirs distincts

* Cf Note de service DGAL/SDSPA/N2000-8059 du 31 mars 2000

** méconium de 250 poussins issus du troupeau de reproducteurs

*** 250 g de coquilles constitués de 25 unités de 10 g de coquilles d'œufs brisés provenant de 25 paniers d'éclosoirs distincts

3- Prélèvements sur volailles de reproduction en période d'élevage, filière œufs de consommation-V2

semaines	*AM 26 octobre 1998*	AM 15 mars 2007
1 jour	*5 fonds de boites (1 éch)*	**5 fonds de boîtes (1 éch)** **et 5 fonds de boîtes conservés 8 semaines au laboratoire** **SE SI SH ST SV**
4	*60 fientes (1 éch)* *et 1 chiffonnette (1 éch)*	**SOL:** **3 paires de stéribottes (3 éch)** **et 2 chiffonnettes - envirt.(fientes) (2 éch)** **SE SI SH ST SV**
		BATTERIE: **3 chiffonnettes - tapis de fientes (3 éch)** **et 1 chiffonnette - fonds de cages (1 éch)** **et 1 chiffonnette - envirt. (fientes) (1 éch)** **SE SI SH ST SV**
2 sem avant transfert ou entrée en ponte	*60 fientes (1 éch)* *et 1 chiffonnette (1 éch)*	**SOL:** **3 paires de stéribottes (3 éch)** **et 2 chiffonnettes - envirt. (fientes) (2 éch)** **SEROTYPAGE COMPLET MDO**
		BATTERIE: **3 chiffonnettes - tapis de fientes (3 éch)** **et 1 chiffonnette - fonds de cages (1 éch)** **et 1 chiffonnette - envirt. (fientes) (1 éch)** **SEROTYPAGE COMPLET MDO**

NB : Prélèvements pour les troupeaux en provenance d'un couvoir ayant reçu des œufs à couver d'élevages non adhérents à la Charte Sanitaire :

une chiffonnette de fond de casier d'éclosoir
et des papiers déposés sur le carrousel de tri
et recherche d'inhibiteurs dans un lot de 10 œufs à couver ou de 10 poussins d'un jour
SE SI SH ST SV

4- Prélèvements sur volailles de reproduction en période de ponte, filière œufs de consommation –V2

semaines	*AM 26 octobre 1998**		AM 15 mars 2007	
	élevage	*couvoir*	élevage	couvoir
			entrée en ponte	
24 (VS/ DDSV)			5 paires de stéribottes (SOL) (2 éch) ou 2x150 g de fientes (CAGE) (2éch) ou 300 fientes (2 éch) et 1 chiffonnette - envirt. (1 éch) SE ST SH SI SV (VS/DDSV)	
26	*60 fientes (1 éch) + 1 chiffonnette (1 éch)*			5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch)*** SE ST SH SI SV
28		*1 chiffonnette (1 éch) ou 5 fonds d'éclosoir (1 éch) ou méconiums (1 éch) ***		5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch)*** SE ST SH SI SV
30		*1 chiffonnette ou 5 fonds d'éclosoir ou méconiums ***		5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
32		*1 chiffonnette ou 5 fonds d'éclosoir ou méconiums ***		5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
34	*60 fientes + 1 chiffonnette*			5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) et 20 obne (2 éch)**** SE ST SH SI SV
36		*1 chiffonnette ou 5 fonds d'éclosoir ou méconiums ***		5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
38[1] (VS/DDSV)		*1 chiffonnette ou 5 fonds d'éclosoir ou méconiums ***	2 paires de stéribottes (SOL) (2 éch) ou 2 chiffonnettes - tapis de fientes (CAGE) (2 éch) et 1 chiffonnette - envirt. (1 éch) SE ST SH SI SV	5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV (VS/DDSV)
40		*1 chiffonnette ou 5 fonds d'éclosoir ou méconiums ***		5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
42	*60 fientes + 1 chiffonnette*			5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
44		*1 chiffonnette ou 5 fonds d'éclosoir ou méconiums ***		5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
46		*1 chiffonnete ou 5 fonds d'éclosoir ou méconiums ***		5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
48		*1 chiffonnette ou 5 fonds d'éclosoir ou méconiums ***		5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
50	*60 fientes + 1 chiffonnette*			5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) et 20 obne (2 éch) SE ST SH SI SV
52		*1 chiffonnette ou 5 fonds d'éclosoir ou méconiums ***		5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
54[1] (VS/DDSV)		*1 chiffonnette ou 5 fonds d'éclosoir ou méconiums ***	2 paires de stéribottes (SOL) (2 éch) ou 2 chiffonnettes - tapis de fientes (CAGE) (2 éch) et 1 chiffonnette - envirt. (1 éch) SE ST SH SI SV	5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV (VS/DDSV)
56		*1 chiffonnette ou 5 fonds d'éclosoir ou méconiums ***		5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
58	*60 fientes + 1 chiffonnette*			5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
60				5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
62[2] (VS/DDSV)			5 paires de stéribottes (SOL) (2 éch) ou 2x150 g de fientes (CAGE) (2éch) ou 300 fientes (2 éch) et 1 chiffonnette - envirt. (1 éch) SEROTYPAGE COMPLET MDO (VS/DDSV)	5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
64				5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
66				5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV
68				5 fonds éclosoirs 1m² (1 éch) ou 250 g de coquilles (1 éch) SE ST SH SI SV

(1) Les dates de prélèvements couvoir sont données à titre indicatif : l'arrêté et le règlement fixent 16 semaines d'écart entre les prélèvements des autorités sanitaires (VS/DDSV)

(2) 62 semaines est indicatif, le prélèvement officiel par le VS ou la DDSV est à réaliser "au cours des 8 semaines précédant la fin du cycle de production". Le sérotypage complet est à réaliser lors de ce dernier contrôle DDSV/VS.

* Cf Note de service DGAL/SDSPA/N2000-8059 du 31 mars 2000

** méconium de 250 poussins issus du troupeau de reproducteurs

*** 250 g de coquilles constitués de 25 unités de 10 g de coquilles d'œufs brisés provenant de 25 paniers d'éclosoirs distincts

**** obne : œufs bêchés non éclos

5- Prélèvements sur volailles de production en période d'élevage, filière œufs de consommation (poulettes) –V2

semaines	*AM 26 octobre 1998*	AM 15 mars 2007
1 jour	*5 fonds de boites (1 éch)*	5 fonds de boîtes (1 éch) et 5 fonds de boîtes conservés 8 semaines au laboratoire SE SI SH ST SV
4	*60 fientes (1 éch)* *et 1 chiffonnette (1 éch)*	SOL: 2 paires de stéribottes (2 éch) et 2 chiffonnettes - envirt. (fientes) (2 éch) soit total 4 éch SE ST
		BATTERIE: 2 chiffonnettes - tapis de fientes (2 éch) 1 chiffonnette - fonds de cages (1 éch) 1 chiffonnette - envirt. (fientes) (1 éch) soit total 4 éch SE ST
2 sem avant transfert ou entrée en ponte	*60 fientes (1 éch)* *et 1 chiffonnette (1 éch)*	SOL: 2 paires de stéribottes (2 éch) et 2 chiffonnettes - envirt. (fientes) (2 éch) soit total 4 éch SEROTYPAGE COMPLET MDO
		BATTERIE: 2 chiffonnettes - tapis de fientes (2 éch) 1 chiffonnette - fonds de cages (1 éch) 1 chiffonnette - envirt. (fientes) (1 éch) soit total 4 éch SEROTYPAGE COMPLET MDO

NB : Prélèvements pour les troupeaux en provenance d'un couvoir ayant reçu des œufs à couver d'élevages non adhérents à la Charte Sanitaire :

une chiffonnette de fond de casier d'éclosoir
et des papiers déposés sur le carrousel de tri
et recherche d'inhibiteurs dans un lot de 10 œufs à couver ou de 10 poussins d'un jour
SE SI SH ST SV

6- Prélèvements sur volailles de production en période de ponte, filière œufs de consommation (poules pondeuses)-V2

semaines	*AM 26 octobre 1998*	AM 15 mars 2007
entrée en ponte		
24 au plus tard	*60 fientes (1 éch)* *ou 1 chiffonnette (cages : tapis de fientes)* *ou 2 chiffonnettes (litière)* *ou 1 paire de stéribottes* *et 1 chiffonnette*	**SOL:** **60 fientes fraîches (1 éch)** **ou 1 paire de stéribottes (1 éch)** **ou 1 chiffonnette sur caillebottis perchoirs dépots (1 ech)** **et 1 chiffonnette envirt. (1 éch)** **soit total 2 éch** **SE**
		BATTERIES: **60 fientes fraîches (1 éch)** **ou 2 chiffonnettes- tapis de fientes (1 éch)** **ou 2 chiffonnettes 20 fonds de cage (1 éch)** **et 1 chiffonnette envirt. (1 éch)** **soit total 2 éch** **SE**
40	*60 fientes* *ou 1 chiffonnette (cages : tapis de fientes)* *ou 2 chiffonnettes (litière)* *ou 1 paire de stéribottes* *et 1 chiffonnette*	**SOL:** **60 fientes fraîches (1 éch)** **ou 1 paire de stéribottes (1 éch)** **ou 1 chiffonnette sur caillebottis perchoirs dépots (1 ech)** **et 1 chiffonnette envirt. (1 éch)** **soit total 2 éch** **SE**
		BATTERIES: **60 fientes fraîches (1 éch)** **ou 2 chiffonnettes- tapis de fientes (1 éch)** **ou 2 chiffonnettes 20 fonds de cage(1 éch)** **et 1 chiffonnette envirt. (1 éch)** **soit total 2 éch** **SE**
55	*60 fientes* *ou 1 chiffonnette (cages : tapis de fientes)* *ou 2 chiffonnettes (litière)* *ou 1 paire de stéribottes* *et 1 chiffonnette*	**SOL:** **60 fientes fraîches (1 éch)** **ou 1 paire de stéribottes (1 éch)** **ou 1 chiffonnette sur caillebottis perchoirs dépots (1 ech)** **et 1 chiffonnette envirt. (1 éch)** **soit total 2 éch** **SE**
		BATTERIES: **60 fientes fraîches (1 éch)** **ou 2 chiffonnettes- tapis de fientes (1 éch)** **ou 2 chiffonnettes 20 fonds de cage(1 éch)** **et 1 chiffonnette envirt. (1 éch)** **soit total 2 éch** **SE**
> 60 (1)		**2 chiffonnettes envirt. (2 éch) par tranche de 30 000 pondeuses** **ST**
SI SECONDE PONTE		
EP-2 sem	*60 fientes* *ou 1 chiffonnette (cages : tapis de fientes)* *ou 2 chiffonnettes (litière)* *ou 1 paire de stéribottes* *et 1 chiffonnette*	**BATTERIES: prélèvements identiques à ceux de la première ponte** **SOL: prélèvements identiques à ceux de la première ponte** **soit total 2 éch** **SE**
entrée en ponte		
EP+2 sem	*60 fientes* *ou 1 chiffonnette (cages : tapis de fientes)* *ou 2 chiffonnettes (litière)* *ou 1 paire de stéribottes* *et 1 chiffonnette*	**BATTERIES: prélèvements identiques à ceux de la première ponte** **SOL: prélèvements identiques à ceux de la première ponte** **soit total 2 éch** **SE**
toutes les 12 sem	*60 fientes* *ou 1 chiffonnette (cages : tapis de fientes)* *ou 2 chiffonnettes (litière)* *ou 1 paire de stéribottes* *et 1 chiffonnette*	**BATTERIES: prélèvements identiques à ceux de la première ponte** **SOL: prélèvements identiques à ceux de la première ponte** **soit total 2 éch** **SE**
R - 5 sem (1) ou R - 9 sem (1)		**2 chiffonnettes envirt. (2 éch) par tranche de 30 000 pondeuses** **ST**

(1) A partir du 1er juin 2007. Ces prélèvements sont constitués de deux chiffonnettes pour chaque troupeau par tranche de 30 000 pondeuses ; date de prélèvement ici indicative, à choisir à partir de 60 semaines et dans le délai optimum, soit dans la mesure du possible 5 ou 9 semaines avant réforme selon le mode de production, y compris en cas de seconde ponte.

ANNEXE VII : Prélèvements de confirmation/investigations/contrôles renforcés

1- Prélèvements sur volailles de reproduction en période d'élevage, filière chair

	AM 26 octobre 1998	AM 15 mars 2007
1	*60 fientes* *et 1 chiffonnette*	**5 paires de stéribottes (5 éch)** **ou 2x150 g de fientes (cage) (2 éch) et *3 chiff tapis, hors AM (3 ech)*** **ou 300 fientes (2 éch) et *3 chiff caillebottis nids, hors AM (3 ech)*** **et 1 chiffonnette - envirt. (1 éch)** **et 60 œufs bêchés non éclos si suspicion au couvoir** **SE SI SH ST SV**
2	*organes de 60 sujets (foies, ovaires et caeca)* *groupés par 5 donc 36 éch*	**soit organes de 60 sujets (foies, ovaires et caeca) (36 éch)** **soit mêmes analyses qu'au premier prélèvement de confirmation** **et éventuellement, recherche d'inhibiteurs sur au moins 5 sujets (DDSV)** **SE SI SH ST SV**

2- Prélèvements sur volailles de reproduction en période de ponte, filière chair

	AM 26 octobre 1998		AM 15 mars 2007
	production	***couvoir***	**production**
1	*60 fientes (1 éch)* *et 1 chiffonnette (1 éch)*	*60 fientes (1 ech)* *et 1 chiffonnette(1 ech)* *et 60 œufs incubés non éclos (1 éch)*	**5 paires de stéribottes (5 éch)** **ou 2x150 g de fientes (cage) (2 éch) *et 3 chiff tapis, hors AM (3 ech)*** **ou 300 fientes (sol) (2 éch) *et 3 chiff caillebottis nids, hors AM* (3 ech)** **et 1 chiffonnette - envirt. (1 éch)** **(VS ou DDSV)** **SE ST SH SI SV**
2	*organes de 60 sujets (foies, ovaires et caeca) groupés par 5 donc 36 éch (NFU 47 100)*		**soit organes de 60 sujets (foies, ovaires et caeca) (36 éch)** **soit mêmes analyses qu'au premier prélèvement de confirmation** **et éventuellement, recherche d'inhibiteurs sur au moins 5 sujets** **SE ST SH SI SV**

3- Prélèvements sur volailles de reproduction en période d'élevage, filière œufs de consommation

	AM 26 octobre 1998	AM 15 mars 2007
1	*60 fientes* *et 1 chiffonnette*	**5 paires de stéribottes (5 éch)** **ou 2x150 g de fientes (cage) (2 éch) *et 3 chiff tapis, hors AM* (3 ech)** **ou 300 fientes (2 éch) *et 3 chiff caillebottis nids, hors AM* (3 ech)** **et 1 chiffonnette - envirt. (1 éch)** **et 60 œufs bêchés non éclos si suspicion au couvoir** **SE SI SH ST SV**
2	*Organes de 60 sujets (foies, ovaires et caeca) groupés par 5* ***donc 36 éch***	**soit organes de 60 sujets (foies, ovaires et caeca)(36 éch)** **soit mêmes analyses qu'au premier prélèvement de confirmation** **et éventuellement, recherche d'inhibiteurs sur au moins 5 sujets (DDSV)** **SE SI SH ST SV**

4- Prélèvements sur volailles de reproduction en période de ponte, filière œufs de consommation

	*AM 26 octobre 1998**		AM 15 mars 2007
	production	***couvoir***	**production**
1	*60 fientes* *et 1 chiffonnette*	*60 fientes* *et 1 chiffonnette* *et 60 œufs incubés non éclos*	**5 paires de stéribottes (5 éch)** **ou 2x150 g de fientes (cage) (2 éch) *et 3 chiff tapis, hors AM* (3 ech)** **ou 300 fientes (2 éch) *et 3 chiff caillebottis nids, hors AM* (3 ech)** **et 1 chiffonnette - envirt. (1 éch)** **et 60 œufs bêchés non éclos si suspicion au couvoir** **SE SI SH ST SV**
2	*organes de 60 sujets (foies, ovaires et caeca)*	*organes de 60 sujets (foies, ovaires et caeca)*	**soit organes de 60 sujets (foies, ovaires et caeca)(36 éch)** **soit mêmes analyses qu'au premier prélèvement de confirmation** **et éventuellement, recherche d'inhibiteurs sur au moins 5 sujets (DDSV)** **SE SI SH ST SV**

5- Prélèvements sur volailles de rente en période d'élevage, filière œufs de consommation

	AM 26 octobre 1998	AM 15 mars 2007
1	*60 fientes* *ou 1 chiffonnette sur tapis de fientes (cage)* *ou 1 chiffonnette* *ou 1 paire de stéribottes* *et 1 chiffonnette*	**60 fientes (sol) (1 éch)** **ou 1 chiffonnette - tapis de fientes (cage)(1 éch)** **ou 2 chiffonnettes - litière (1 éch)** **ou 1 paire de stéribottes (sol) (1 éch)** **et 5 chiffonnettes - envirt. (5 éch)** **SE ST**
2	*soit 60 fientes* *ou 1 chiffonnette sur tapis de fientes (cage)* *ou 2 chiffonnettes* *ou 1 paire de stéribottes* *et 1 chiffonnette* *soit organes de 60 sujets (foies, ovaires et caeca) groupés par 5 (36 éch)*	**soit organes de 60 sujets (foies, ovaires et caeca) (36 ech)** **soit mêmes analyses qu'au premier prélèvement de confirmation** **et éventuellement, recherche d'inhibiteurs sur au moins 5 sujets** **SE ST**

6- Prélèvements sur volailles de rente en période de ponte, filière œufs de consommation

	AM 26 octobre 1998	AM 15 mars 2007
1	*60 fientes* *ou 1 chiffonnette sur tapis de fientes (cage)* *ou 2 chiffonnettes* *ou 1 paire de stéribottes* *et 1 chiffonnette*	**SOL:** **60 fientes fraîches (1 éch)** **ou 2 chiffonnettes - litière (1 éch)** **ou 1 paire de stéribottes (1 éch)** **et 5 chiffonnettes - envirt. (5 éch)** **et 36 oeufs (6 éch de 6 oeufs)** **soit total (a minima) 12 éch** (dont 6 d'oeufs) **SE (ST)**
		BATTERIE: **60 fientes fraîches (1 éch)** **ou 1 chiffonnette - tapis de fientes (1 éch)** **ou 1 chiffonnette 20 fonds de cage (1 éch)** **et 5 chiffonnettes - envirt. (5 éch)** **et 36 oeufs (6 éch de 6 oeufs)** **soit total (a minima) 12 éch** (dont 6 d'oeufs) **SE (ST)**
2	*soit 60 fientes* *ou 1 chiffonnette sur tapis de fientes (cage)* *ou 2 chiffonnettes* *ou 1 paire de stéribottes* *et 1 chiffonnette* *soit organes de 60 sujets (foies, ovaires et caeca) groupés par 5 (36 éch)*	**soit organes de 60 sujets (foies, ovaires et caeca) (36 ech)** **soit mêmes analyses qu'au premier prélèvement de confirmation** **et éventuellement, recherche d'inhibiteurs sur au moins 5 sujets** **SE (ST)**