



MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

<p>Direction générale de l'alimentation Service de la prévention des risques sanitaires de la production primaire Sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux Bureau des semences et de la santé des végétaux</p> <p>Adresse : 251 rue de Vaugirard 75 732 PARIS CEDEX 15</p> <p>Suivi par : Olivier Dufour Tél : 01 49 55 81 64 Courriel institutionnel : bssv.sdqpv.dgal@agriculture.gouv.fr Réf. Interne : BSSV/2013-10-014 MOD10.21 E 01/01/11</p>	<p>NOTE DE SERVICE DGAL/SDQPV/N2013-8173 Date: 22 octobre 2013</p>
--	---

A l'attention de mesdames et messieurs les Préfets

Date de mise en application : immédiate
Abroge et remplace : Note de service DGAL/SDQPV/N2013-8017 du 25 janvier 2013
Date d'expiration : Sans objet
Date limite de réponse/réalisation : Sans objet
📎 Nombre d'annexe : 0
Degré et période de confidentialité : Aucune

Objet : Méthode officielle d'analyse, MOA 026 version 2, pour la détection du Pepino mosaic virus (PepMV) sur tomate (feuilles, fruits et semences non traitées) par DAS-ELISA et méthode interne de confirmation réalisée au LNR pour les échantillons indéterminés.

Références :

- Articles L. 202-1 à 5, et R. 202-1 à 21 du Code rural et de la pêche maritime ;
- Décret 2006-7 du 4 janvier 2006 relatif aux laboratoires nationaux de référence, ainsi qu'à l'agrément et à la reconnaissance des laboratoires d'analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux ;
- Arrêté ministériel du 19 décembre 2007 fixant les conditions générales d'agrément des laboratoires d'analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux ;
- Arrêté du 29 décembre 2009 modifié, désignant les laboratoires nationaux de référence dans le domaine de la santé publique vétérinaire et phytosanitaire.

Résumé : La présente note a pour objet la publication de la méthode officielle d'analyse (MOA 026 version 2) pour la détection par méthode DAS-ELISA du *Pepino mosaic virus* (PepMV) sur tomate (feuilles, fruits et semences non traitées).

Mots-clés : Virologie - méthode officielle d'analyse - MOA - analyses - ELISA - détection - Pepino mosaic virus - PepMV - semences - tomate.

Destinataires
<p>Pour information :</p> <p>DRAAF et DAAF Anses-Laboratoire de la santé des végétaux SIVEP</p>

La présente note a pour objet la publication de la méthode officielle d'analyse (MOA 026 version 2) pour la détection par méthode DAS-ELISA du *Pepino mosaic virus* (PepMV) sur tomate (feuilles, fruits et semences non traitées).

Contexte réglementaire

Le PepMV est un virus hautement infectieux par contact sur les plantes tomates et transmis par les semences. Ce virus peut être responsable de baisses notables de rendement dans la production de tomates sous serre auxquelles peuvent s'ajouter des dépréciations qualitatives.

Ce virus a été inclus très tôt dans la liste d'alerte de l'OEPP. Actuellement, ce virus est classé comme organisme nuisible de quarantaine sur les semences de tomate pour l'Union Européenne via la décision de la Commission 2004/200/CE du 27 février 2004. Cette décision, relative aux mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union européenne du virus de la mosaïque du pépino, définit les conditions d'importation et de circulation des semences de tomate dans l'Union européenne (mise en place du passeport phytosanitaire européen – PPE – sur les semences de tomate). De plus, cette décision engage les États membres à réaliser des enquêtes officielles dans les installations destinées à la production de végétaux de tomates et de tomates en vue de détecter le PepMV.

En France, le PepMV fait l'objet de mesures de lutte obligatoire (arrêté du 9 février 2004). En application de la décision de la Commission citée ci-dessus, chaque année une surveillance du PepMV est réalisée notamment au niveau des semences à l'importation ou produites en France, pour détecter la présence de ce virus.

Éléments épidémiologiques et taxonomiques

Le virus de la mosaïque du pépino (PepMV) appartient au genre *Potexvirus* de la famille des *Alphaflexiviridae*.

Décrit pour la première fois au Pérou en 1974, il a été trouvé en 1999 pour la première fois sur tomate (*Solanum lycopersicum*), dans des serres hollandaises et britanniques, puis l'année suivante en France, en Allemagne et en Espagne. Depuis, le virus a également été identifié sur tomate dans de nombreux autres pays européens ainsi qu'aux États-Unis, au Canada, et au Chili.

On distingue 4 génotypes du virus du PepMV : Pérou, Chili2 (CH2), Europe et US1.

La souche CH2, majoritairement présente sur le territoire européen, comprend 2 variants (99.4 % identité) qui se distinguent par la sévérité des symptômes qu'ils induisent : CH2-mild et CH2-aggressive (Hanssen *et al.* 2009). En France, la souche CH2-mild est très répandue dans les Pyrénées-Orientales et en région PACA depuis 2007.

Le projet PEPEIRA (*Pepino mosaic virus* : epidemiology, economic impact and pest risk analysis) lancé en février 2007 a montré un taux moyen de transmission du virus de la semence à la plantule de 0,026%.

Dans le cas du pathotype européen CH2-mild (peu sévère), rencontré très majoritairement en France, le virus peut être présent sans induire de symptômes.

Dans le cas du pathotype CH2-aggressive, rencontré que très ponctuellement en France, la croissance des plants est fortement réduite.

Méthode de détection

La méthode officielle pour la détection du PepMV sur semences non traitées de tomates, feuilles ou fruits est la MOA 026 version 2. Cette méthode, basée sur la technique ELISA, est disponible sur le site internet de l'Anses (www.anses.fr).

Cette version 2 se distingue de la précédente méthode (MOA 026 version 1a) officialisée en janvier 2013 (DGAL/SDQP/N2013-8017 du 25 janvier 2013) par l'extension de son périmètre aux feuilles et fruits de tomates. En outre, elle inclut également dans le schéma de détection un test de confirmation pour l'(les) échantillon(s) indéterminé(s) en ELISA (méthode moléculaire interne effectuée uniquement par le Laboratoire national de référence - LNR : Anses - Laboratoire de la santé des végétaux - LSV, Unité Bactériologie, Virologie et OG M - BVO, à Angers).

Analyses officielles ; confirmation

La méthode de détection MOA 026 version 2 doit être utilisée pour les analyses officielles sur feuilles, fruits et semences de tomates non traitées, notamment dans le cadre des contrôles phytosanitaires concernant le PepMV en surveillance du territoire, à l'importation et à l'exportation. Cette méthode sérologique permet la détection du PepMV sur feuilles, fruits et semences de tomates.

La méthode officielle de confirmation reste la méthode par biologie moléculaire (méthode interne du LNR, Unité BVO de l'Anses-LSV station d'Angers).

Le Directeur Général Adjoint
Chef du Service de la Coordination
des Actions Sanitaires – C.V.O.

Signé : Jean-Luc ANGOT